NOTE VII.

DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE DYTISCIDES DU MUSÉE DE LEYDE

DÉCRITES PAR

M. RÉGIMBART.

Bidessus divisus, n. sp.

Long. 2 mill. — *Oblongo-ovalis, elongatus, subparallelus; capite et pronoto rufis, hoc ad basin late transversim nigricante, sat tenuiter in disco et fortius apud basin punctato; elytris nigris, margine laterali ad apicem dilatato, macula elongata minuta post medium ad latera, fasciaque post basali in tribus maculis divisa quarum interna minuta et subrotunda, intermedia valde elongata, externa majore cum margine omnino confluente, flavis, ornatis, sat dense punctatis, pubescentibus, persubtilissime vix visibiliter reticulatis; subtus corpore nigricante, antennis pedibusque rufis. Plica thoracica obliqua, in elytris brevissime continuata.*

Cette espèce extrêmement voisine de *B. striola* Sharp s'en distingue par la couleur noire des élytres avec les dessins jaunes bien accusés et bien limités, ainsi disposés: une bordure latérale assez large et dilatée au sommet, une tache allongée et petite en arrière du milieu, très près de cette bordure qu'elle ne touche pas, et une bande post basale divisée plus ou moins complètement en trois taches dont l'interne, petite et presque arrondie, est quelquefois nulle, l'intermédiaire beaucoup plus grande et très allongée, l'externe également très grande et très allongée, entièrement confluente avec la bordure. De même que chez *B.*

striola la strie prothoracique est oblique et ne se prolonge sur les élytres que par un petit trait très court.

Hab. Borneo: Sambas (Th. F. Lucassen). — Quatre exemplaires.

Laccophilus Lucasseni, n. sp.

Long. vix 4 mill. — *Ovalis, sat latus, postice attenuatus, convexus; capite et pronoto rufis, hoc ad basin et antice transversim late nigro; elytris nigris, plus minus praecipue ad latera rufo suffusis, margine laterali, vitta transversa basali lata integra, postice irregulariter denticulata, altera vitta ante apicali plus minus nigro irrorata et disintegrata, apice lineaque suturali angusta, flavis; subtus piceus, plus minus ferrugatus, pedibus antennisque rufis. Reticulatione duplici, areolis minutis vix distinctis.*

Forme ovale, assez large, surtout en avant, atténuée en arrière, convexe, le dessus du corps couvert d'une réticulation double dont les petites aréoles très superficielles sont difficilement perceptibles, tandisque les grandes polyédriques ont leurs contours bien imprimés; la tête et le pronotum sont roux testacé, ce dernier avec une marque transversale noire assez large en avant et le long de la base; élytres noires, plus ou moins irrorées de jaune, surtout sur les côtés, avec la bordure et une large bande basale irrégulièrement dentée en arrière, étroitement séparée de la suture, mais largement réunie à la bordure, jaunes; on remarque ensuite entre le milieu et le sommet une bande transversale irrégulière, assez large, beaucoup moins nette, semée et obscurcie de points noirs plus ou moins nombreux qui la rendent nébuleuse; enfin le sommet lui-même est plus ou moins distinctement jaune.

Hab. Java: Simpar, Tegal; 3000 pieds (Th. F. Lucassen). — Quatre exemplaires.

Evreux, Novembre 1892.